

>> SUAP-FTO-02 Obstruction Aïgue des Voies Aériennes (OAVA) : Claque dans le dos



Nombre d'équipiers



Matériel

Aucun



Indications

Les claques dans le dos sont réalisées immédiatement lorsqu'une victime consciente (adulte, enfant ou nourrisson) présente une obstruction totale des voies aériennes.



Justification

Le but est de provoquer un ébranlement de la trachée destiné à déclencher des mouvements de toux qui vont permettre de débloquer et d'expulser le corps étranger qui obstrue les voies aériennes.



Risques

Le risque minime de blesser la victime ne doit pas diminuer la vigueur des claques qui est absolument nécessaire au rejet du corps étranger.



Réalisation



Victime debout

- Adulte et grand enfant

- Se positionner sur le côté et légèrement en arrière de la victime.
- Soutenir son thorax avec une main posée soit directement sur le thorax soit sur les avant-bras.
- Pencher suffisamment la victime en avant.



Victime assise

💡 Cela permet au corps étranger dégagé de sortir de la bouche plutôt que de retourner dans les voies aériennes.



Victime debout

- Donner de 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos de la victime, entre les deux omoplates, avec le talon de l'autre main ouverte.
- Arrêter les claques dans le dos dès que la désobstruction est constatée soit par :
 - le rejet du corps étranger
 - la reprise d'une respiration normale
 - l'apparition de toux



Victime assise

💡 En cas d'inefficacité, après 5 claques dans le dos, réaliser des compressions abdominales ou thoraciques.



- Enfant

- La technique des claques dans le dos est identique à celle de l'adulte. Toutefois, elle est améliorée si la tête de l'enfant est placée encore plus vers le bas.



- Pour cela, l'équipier peut s'asseoir et basculer l'enfant au-dessus de son genou afin de lui donner les claques dans le dos.

💡 Si ce n'est pas possible, il réalisera la technique comme chez l'adulte.

- Nourrisson



- Coucher le nourrisson, tête penchée en avant à califourchon sur l'avant-bras, de façon à ce que sa tête soit plus basse que son thorax ce qui facilite l'expulsion du corps étranger.
- Maintenir la tête avec les doigts, de part et d'autre de l'angle de la mandibule tout en évitant d'appuyer sur sa gorge.
- Donner 1 à 5 claques dans le dos du nourrisson, entre les deux omoplates, avec le talon de la main ouverte.
- Arrêter les claques dans le dos dès que la désobstruction est constatée soit par :
 - le rejet du corps étranger.
 - la reprise d'une respiration normale.
 - l'apparition de toux ou de pleurs, de cris chez le nourrisson.

💡 En cas d'inefficacité, après 5 claques dans le dos, réaliser des compressions abdominales ou thoracique.



—Points clés—

Pour être efficaces, les claques dans le dos sont données :

- Entre les omoplates.
- Avec le talon de la main ouverte.
- De façon vigoureuse.



—Critères d'efficacité—

- Rejet du corps étranger.
- Reprise d'une respiration normale.
- Apparition de toux chez l'adulte et de pleurs ou de cris chez l'enfant ou le nourrisson.