

Référence :	PR 06 P 03	Version :	1.1.1	Mise à jour :	septembre-14
-------------	------------	-----------	-------	---------------	--------------

# Prise en charge du nouveau né à la naissance

- poser le nouveau-né sur le ventre de sa mère et sur le côté, peau contre peau, la tête bien dégagée ;
- mettre une paire de gants à usage unique propre ;
- examiner le nouveau né en appréciant :
  - son cri ou sa respiration ;
  - son tonus (mouvements spontanés des membres) ;
  - sa couleur<sup>1</sup>.
- sécher par tamponnement la peau du bébé, à l'aide d'une serviette propre sèche et tiède ou le glisser immédiatement dans un sac en polyéthylène sans séchage préalable ;
- couvrir sa tête à l'aide d'un bonnet en jersey ;
- envelopper le nouveau-né dans une couverture isotherme en attendant une prise en charge spécialisée.
- couvrir la mère ;
- surveiller le nouveau-né.

## Le nouveau né est en bonne santé

Le nouveau-né en bonne santé présente une respiration et un cri vigoureux ; un tonus vif, une coloration rapidement rosée.

- mesurer si possible :
  - la saturation en oxygène ;
  - la fréquence cardiaque au niveau du pouls huméral.
- protéger le nouveau-né contre le froid. Pour cela :

Lors de son transport, le nouveau né doit être placé dans un système fermé et fixé (incubateur, lit-auto). Il ne doit pas être transporté sur le ventre de sa mère.

## Le nouveau né n'est pas en bonne santé

Le nouveau-né n'est pas en bonne santé lorsqu'il ne respire pas ou présente une respiration anormale, ne crie pas, est hypotonique et pâle.

Dans ce cas demander en urgence un avis médical et appliquer les consignes reçues.

<sup>1</sup> A la naissance, un nouveau-né peut présenter une cyanose initiale qui est normale car la saturation en oxygène est basse. En quelques minutes cette cyanose disparaît.