

Bilan Primaire

Évaluer les lieux

- Sécurité
- Situation

Secours suffisant ?

Non

Demande de renfort

Oui

Évaluation de la victime

Premier regard (État sexe
âge position trauma ?)

X Contrôle des hémorragies

A Voie Aérienne ± Stabilisation du rachis

Libre ?



Non => LVA +/- Aspiration

Oui

B Respiration

Non => RCP

Oui > à 6mvt/min

- FR/10s Amplitude+ signes de Tirage ± symétrie
- Sat si disponible
- Impossibilité de faire une phrase
- Muqueuses (cyanose sueurs)

O2 si critique en **B**
Demi assis

C Circulation

- Palpation des boites à sang
- Pouls (les deux radial) 10s + TRC
- Pâleur sueur T ? peau froide marbrures
- soif

Allongé ± Jambes sur
élevées
± O2 si critique en **C**

D Déficit neurologique

AVPU + Pupilles + PCi
+Convulsion ? + Déficit
sensito/moteur ?

PLS
Allongé
O2 si critique en **D**

E Exposition

- Lutter contre
l'hypothermie
- Lésions cachées

Examen
Couvrir

Bilan Secondaire

Bilan Secondaire

En systématique

- Saturation en O₂
- Fréquence Respiratoire sur 1 min
- Tension artériel
- Fréquence Cardiaque sur 1 min

- Si peau rouge
- Si suspicion Hypothermie
- Si victime non traumatique Critique

Selon les circonstances :

- Température
- Glycémie
- EVA

- D critique
- Malaise
- Alcoolisation
- Sueurs tremblement
- Diabète

En parallèle

- S Symptôme analyse de la plainte PQRST
- A Allergie
- M Médicament
- P Passé médicale atcd
- L Last Meal dernier repas
- E Événement
- R Risques sur ajoutés

Enfin

Examen complet de la tête au pieds à la recherche de :

- Déformation/douleur
- Signes de traumatisme
- Saignement
- Hématome
- Plaie
- Brûlures

Si présent rechercher les signes spécifiques