

Anaphylaxie

1

Examen

tomate
oeuf
pollen
aspirine
poils de chat
acariens
lactose
arachide
FRAISES
Médicaments
Hyménoptères
Henne

Contexte (1 seul critère)

- Contact avec allergène
- Réaction allergique cutanée

ET (1 seul critère suffit)

- Détrousse circulatoire
(FC > 120, PAS < 90...)
- Détrousse ventilatoire

2

Conduite à tenir

Atteindre les objectifs tensionnels suivants :

Patients > à 10 ans : PAS $\geq$ 90 mmHg

Enfant de 1 à 10 ans : PAS $\geq$ 70 mmHg + (2 x l'âge en année) mmHg

Enfant < à 15 kg = 0.15 mg
Enfant $\geq$ à 15 kg = 0.3 mg
>à 12 ans = 0.5 mg

Réinjection d'adrénaline
aux mêmes doses

Adrenaline
IM
Quadriceps

VVP

Remplissage
20 ml/kg en
15 minutes

Evaluation
à + 5 mn
puis **toutes**
les 10 mn

Pisu Asthme
et allergie
cutanée
(si besoin)

Surveillance de la tension et du pouls toutes les minutes car
Adrénaline à répéter tant que l'objectif tensionnel n'est pas atteint.